

# Faktablad 6 om giftigt för hundar

Hundar kan drabbas av förgiftning efter att ha fått i sig olämpliga ämnen. Symptomen beror på vilket slags ämne hunden fått i sig och kan därför visa sig på många olika sätt. Här tar vi upp vad som kan vara farligt för hunden, vilka de vanligaste symptomen är och vad du ska göra. OBS! Kontakta alltid veterinär omgående om du tror att hunden fått i sig något olämpligt, även om hunden inte visar symptom. Försök inte framkalla kräkning på egen hand, det finns risk att hundens tillstånd förvärras av det. Hos veterinär kan hunden ibland få medicin som framkallar kräkning, och på så sätt kan allvarliga följder av förgiftning många gånger förhindras. Därför är det viktigt att direkt kontakta veterinär vid förgiftningstillbud.

## Läkemedelsförgiftning

Ger olika symtom beroende på vilket läkemedel hunden ätit. Ta om möjligt med medicinförpackningen till kliniken! Förvara mediciner oåtkomliga för hunden. Ge ALDRIG ditt djur av din egen medicin. Djur har inte alltid samma upptagningsförmåga och metabolism som människor. Att mediciner är receptfria betyder inte att de är ofarliga. Var även försiktig med hälsokost och naturläkemedel. Om hunden har fått medicin utskriven ska du aldrig öka dosen utan ordination från veterinär. Ge inte medicin som är utskriven åt ett annat djur till din hund.

## Rengöringsmedel

Rengöringsmedel har lite olika egenskaper. Vissa medel kan vara starkt sura (avkalkningsmedel, toalettrensning), andra starkt alkaliska (kaustiksoda, avloppsrensning, avlutningsmedel, blekmedel, hushållssoda, maskindiskmedel, släkt kalk) eller innehålla lösningsmedel. Maskindiskmedel är liksom många andra rengöringsmedel starkt frätande.

**Symptom** på att hunden har fått i sig rengöringsmedel kan vara att den dreglar, kräks, får diarré, har buksmärter och matvägrar. Medlen kan även ge frätskador där det kommer i kontakt med huden.

Förgiftning av rengöringsmedel behandlas inte med kräkning, försök inte framkalla kräkning hos hunden! Du kan ge hunden vatten att dricka, för att späda ut medlet, men tvinga inte i hunden vatten. Åk till veterinären direkt!

## Bekämpningsmedel i lantbruk och skogsbruk

Det finns en mängd olika bekämpningsmedel som används inom lant- och skogsbruk, men många av dem återfinns även i vanliga trädgårdar. Om du misstänker att hunden fått i sig ett bekämpningsmedel är det viktigt att veterinären får veta vad medlet innehåller, så om det är möjligt tag med förpackningen.

Generella **symptom** kan vara nedsatt allmäntillstånd, oro, rastlöshet, ryckningar, vinglighet, salivutsöndring, kräkningar, kramper, koma, svaghet i bakbenen, andningsbesvär, diarré samt ökad urinering. För en del medel finns motgift. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din hund kan ha fått i sig bekämpningsmedel, eftersom det finns mer eller mindre allvarliga bekämpningsmedel.

## Råttgift och musgift

Råttgift kan finnas utlagda på offentliga platser, i offentliga byggnader men även i privatpersoners trädgårdar och hus. Om det är skadedjurstekniker som lagt ut giftet brukar de sätta upp varningsskyltar och giftet bör vara i en låda eller liknande så att barn och husdjur inte kommer åt det. Råttgift som innehåller warfarin hindrar blodet från att koagulera.

**Symptomen** är blödningar och de kommer flera dagar efter att hunden fått i sig giftet. Det kan vara synliga blödningar t.ex. nosblod, blåmärken, blödningar i tandkött, blodiga, bruna eller svarta kräkningar eller blod i avföringen. Det kan också vara inre blödningar och symptomen är då otydligare. Nedsatt allmäntillstånd, andningspåverkan, buksmärtor, svullen buk eller vinglighet kan vara tecken på inre blödningar.

Musgift som innehåller alfakloralos orsakar inte blödningar utan påverkar det centrala nervsystemet. Vid alfakloralosförgiftning kommer symptomen snabbt, inom några timmar, och hunden blir trött, förvirrad, får ett nedsatt allmäntillstånd, skakningar, kramper eller koma.

Förgiftningar med råttgift eller musgift är mycket allvarliga, ta direkt din hund till veterinär om du tror att din hund kan ha fått i sig något av det, även om du inte ser några symptom.

### **Etylenglykol (kylarvätska)**

Medlet har en söt smak så hundar kan lätt lockas att smaka på det. Förgiftning kan också ske om hunden slickar bort medel som fastnat i pälsen. Använd propylenglykol till bilen i stället för etylenglykol, det är både miljövänligt och mindre risk för förgiftning, då det inte smakar sött.

Även små doser av etylenglykol kan ge allvarlig förgiftning, en matsked till en liten hund kan vara dödande.

**Symptomen** är ospecifika. Inom första dygnet efter intag ses illamående, kräkningar, obalans och vacklande gång. Kramper, kollaps och koma kan förekomma. Hundens tillstånd förbättras sedan tillfälligt. Senare kommer symptom på njursvikt (hunden kissar och dricker mycket), kräkningar, neurologiska symptom och nedsatt allmäntillstånd. Kontakta veterinären omedelbart om du tror att din hund kan ha fått i sig etylenglykol. Om du har långt till veterinären kan det hända att du blir ordinerad att ge hunden lite alkohol. Behandlingen hos veterinären består av att hunden sätts på etanoldropp (vanlig alkohol). Resultatet blir att kroppen väljer att bryta ner etanolen i alkoholen innan den tar hand om etylenglykolen och den senare hinner passera genom tarmsystemet ut ur kroppen utan att brytas ner.

### **Blågröna alger**

Cyanobakterier (blågröna alger) är organismer som framför allt finns i sötvatten och bräckt vatten (men de förekommer också i saltvatten). Flera arter av cyanobakterier kan bilda toxiner, gifter. Algblomning innebär att cyanobakterierna växer och blir många och det är då de kan synas som grön sörja i vattnet. Algblomning kan dock förekomma utan att de syns för blotta ögat. Bakterierna trivs och växer snabbt när vattnet är mellan 15-30°C, det är svag eller ingen vind och bra med näring i vattnet.

Om en människa eller ett djur får i sig hela cyanobakterier frigörs giftet när cellerna bryts ner i mag-tarmkanalen.

**Symptomen** är varierade, olika algar ger olika symptom. Vid förgiftning ses symptom oftast inom någon eller några timmar. Hunden blir ofta orolig, darrig, kan kräkas och få diarré. I allvarigare fall kan kramper, medvetslöshet och dödsfall förekomma. Giftet kan ge skador på inre organ och centrala nervsystemet.

Låt inte hunden bada i vatten som det kan finnas alger i. Hindra hunden från att slicka i pälsen om den badar. Om din hund badat i vatten som du tror det är cyanobakterier i så tvätta hunden i rent vatten och kontakta veterinär direkt. Om hunden börjar visa symptom kort efter bad, åk direkt till veterinär.

### **Choklad**

Det giftiga ämnet i choklad heter teobromin. Ju mer kakaopulver chokladen innehåller desto större mängd teobromin finns det i den. Mörk choklad är alltså farligare än ljus och störst risk för förgiftning är det om hunden äter kakaopulver. Vit choklad innehåller inte teobromin.

**Symtom** på förgiftning kan ses vid 1,5 g kakaopulver/kg kroppsvikt, 2,5 g mörk choklad/kg kroppsvikt och 18 g mjölkchoklad/kg kroppsvikt. En 200 grams mjölkchokladkaka kan alltså orsaka förgiftning hos en hund som väger 10-15 kg.

**Symptomen** på att hunden fått teobrominförgiftning uppträder vanligtvis efter 6-8 timmar men det kan dröja upp till 24 timmar efter att hunden fått i sig chokladen. Vanliga symptom är rastlöshet och hyperaktivitet. Kräkningar och diarré kan också ses, liksom snabb andning, ökad törst och ökad urinering samt feber. Vid svårare fall får hunden väldigt hög hjärtfrekvens och rytmrubbningar och kan dö av hjärtsvikt. Om du misstänker att hunden ätit choklad bör du kontakta veterinär direkt.

### **Deg och jäst**

Hundar som får i sig deg eller jäst kan få ont i magen. Deg som jäser i magen kan bilda alkohol och resultatet blir alkoholförgiftning. Kontakta veterinär om din hund har ätit deg eller jäst.

## Lök

Alla sorters lök (gul löl, vitlök, gräslök mfl) innehåller alicin som är giftigt för hundar. Alicin finns i både rå och tillagad lök så även lökpulver och rostad lök är farligt för hunden. Olika typer av lök innehåller olika mängder av ämnet så det är svårt att säga hur mycket som är farligt, men det finns en risk för förgiftning om hunden får i sig små mängder regelbundet.

**Symptom** orsakas av blodbrist och kan ses som bleka slemhinnor, snabb hjärtfrekvens och snabb andning, nedsatt allmäntillstånd och svaghet. Kräkningar och diarré kan förekomma, liksom blod i urinen. Om du misstänker att hunden förgiftats av lök ska du direkt ta den till veterinär.

## Nötter

Macadamianötter och svart valnöt är nötter som hunden inte ska äta. De innehåller ett gift som ger kräkningar, darrningar, svag bakdel och hög temperatur. Ring och rådgör med veterinär om du tror att hunden har fått i sig nötter. Om hunden visar symptom ska du åka till veterinär.

## Salt

Om hunden får i sig stora mängder salt kan den få rubbad saltbalans vilket är mycket allvarligt. Hundar kan få i sig för mycket salt om den till exempel dricker saltvatten eller äter trolldag.

**Symptomen** kan vara diarré, kräkningar, svaghet, kramper och koma. Hundar kan dö av saltförgiftning, ta den till veterinär snabbt vid symptom.

## Solanin

Solanin är ett gift som finns i grön potatis och tomatplantor. **Symptomen** är kräkningar och diarré. Kontakta veterinär om du tror att din hund har fått i sig grön rå potatis eller växtdelar från tomatplantor.

## Ekollon och kastanj

Innehåller gifter som kallas glykosider och är giftiga för både hundar och människor.

**Symptom** kan vara illamående, kräkningar och diarré eller förstoppning. Allvarlig förgiftning kan ge skador på njurarna.

Om de sväljs hela kan både ekollon och kastanjer orsaka mekaniskt stopp i tarmen, vilket kan leda till livshotande tillstånd. Kontakta din veterinär om din hund uppvisar symptom som kräkningar, magsmärta, nedsatt allmäntillstånd och matvägran.

## Giftiga växter

Både inom- och utomhus finns en mängd växter som är giftiga för hunden. Minska risken att hunden blir förgiftad genom att hindra den från att tugga på och leka med växter som inte helt säkert är ofgiftiga. På SVA's hemsida kan du läsa mer om giftiga växter.

**Symptom** kan vara följande: slemhinneirritation, svullnad i svalg och mun som ger sväljningsproblem, diarréer och kräkningar. Mjölaktig växtsaft kan vara irriterande för hud och slemhinnor. Det finns ingen generell åtgärd att ta vid specifikt för växter, följ i stället allmänna rekommendationer vid förgiftning och ta kontakt med veterinär för rådgivning.

### Exempel på giftiga krukväxter:

- Trekantseuforbia, High Chaparral
- Julstjärna
- Amaryllis
- Cyklamen
- Fredskalla
- Monstera
- Porslinsblomma
- Prickblad
- Oleander (mycket giftig)

### Exempel på giftiga trädgårdsväxter:

- Blomsterlökar av alla sorter
- Fingerborgsblomma (mycket giftig)
- Klättervildvin (bären)
- Korallbär (bären)
- Liljekonvalj och andra liljor
- Löjtnantshjärta
- Mistel
- Rabarber (speciellt bladen)
- Riddarsporre
- Spikklubba (mycket giftig)
- Tidlösa (mycket giftig)
- Azalea

- Blåregn
- Buxbom
- Gullregn (speciellt fröna)
- Hemlockgran (mycket giftig)
- Hästkastanj
- Idegran (mycket giftig)
- Liguster
- Murgröna (löv och bär mycket giftig)
- Rhododendron

### **Svamp**

Giftiga svampar kan vara irriterande för mag- och tarmkanalen vilket ger **symptomen** salivering, illamående, kräkningar och diarré. Vissa svampar kan ge njur- och leverskador, eller neurologiska förändringar som vinglighet, darrningar, kramper och koma. Kontakta veterinär direkt om du tror att din hund kan ha ätit giftig svamp. Om möjligt ta med dig exemplar av svampen.

### **Paddor**

Paddor och ibland även grodor kan ha giftiga ämnen på huden för att skydda sig från att bli uppätta av andra djur. En hund som har slickat på en padda kan bli orolig, salivera rikligt och ibland kräkas. **Symptomen** är övergående och ofarliga. Kontakta veterinär för råd.

### **Fotogen (lacknafta, varnolen, dilutin, tändvätska och liknande ämnen)**

Om hunden har ätit något av ovanstående ämnen kan **symptomen** vara irritation i svalg och hals. Den allvarligaste följden av förgiftning sker om hunden får ner medlet i lungorna, vilket kan ske om den sväljer medlet. Den kan då få en mycket allvarlig lunginflammation. Om du tror att hunden kan ha fått i sig något av ovanstående ämnen ska du omgående kontakta en veterinär för råd.

Om hunden fått medlet på huden/i pälsen ska den tvättas med vanlig tvål och vatten.

### **Huggormsbett**

När en huggorm biter kan den injicera gift, men mängden varierar och ibland injiceras inget gift alls. **Symptomen** kan först visa sig som nedsatt allmäntillstånd, ovilja att gå och akut håla. Området kring bettet svullnar vanligen kraftigt och gör ont. Vid allvarligare fall kan hunden bli vinglig, kollapsa och bli medvetslös.

Håll hunden stilla så sprids giftet långsammare. Bär om möjligt hunden. Ta den till veterinär omedelbart, även om du inte ser symptom på förgiftning. Symptomen kan komma plötsligt och vara mycket allvarliga. Dödsfall förekommer.

### **Russin och vindruvor**

Det är oklart varför russin och vindruvor är giftigt för hundar och varför endast vissa hundar blir sjuka. Det kan räcka med enstaka vindruvor för förgiftning som leder till akut njursvikt.

**Symptomen** är oftast kräkningar och ibland diarré. Hunden kan också bli svag, vinglig, dricka mer än vanligt och få ont i magen. Kontakta veterinär direkt om du tror att din hund har ätit russin eller vindruvor.

### **Xylitol**

Xylitol finns i sockerfritt godis, lättprodukter, tuggummi och tandkräm. Ämnet sänker blodsockernivån hos hundar, vilket kan vara mycket allvarligt och leda till döden.

**Symptomen** kan vara kräkningar, nedsatt allmäntillstånd, skakningar, kollaps, kramper och koma. Ta din hund direkt till veterinär om den uppvisar symptom. Om du tror att den har fått i sig produkt som innehåller xylitol men den inte uppvisar symptom ska du kontakta veterinär för råd.

### **Mögelförgiftning**

Intag av mögel kan ge olika symptom, beroende på typ av mögel och hur stor mängd hunden äter.

**Symptomen** uppkommer ofta kort efter intag. Hunden kan få neurologiska symptom, med skakningar, vinglighet, kramper och koma. Kräkningar och diarré kan också ses. Kontakta veterinär direkt om du tror att din hund kan ha fått i sig mögel.